

chaque côté du sillon longitudinal postérieur existe un bourrelet analogue aux autres, s'infléchissant brusquement vers la base qu'il longe parallèlement. Cet accident constitue de part et d'autre un crochet isolant une petite côte étroite. Le fond des sillons est parsemé de fines granulations.

Écusson triangulaire à pointe postérieure légèrement émousée. Élytres mats avec les intervalles des stries formés par des carènes étroites et tranchantes. Les deux premières stries, en partant de la suture, de moitié moins larges que les suivantes; ces accidents convergent très légèrement vers le sommet des élytres. Le fond des stries est semé de granulations fines, régulièrement espacées et alignées longitudinalement; épine humérale peu visible.

Losange métasternal surélevé, mat, brun de poix comme toute la région abdominale. présentant en son milieu une large dépression à fond plat et rugueux. Arceaux de l'abdomen glabres, à peine crénelés à leur bord postérieur, présentant à leur bord antérieur de petites stries peu visibles. Dans le dernier segment qui est plus large et plus profond, les stries du bord antérieur sont plus longues et mieux marquées.

Pattes d'un brun testacé. Cuisses intermédiaires et postérieures convexes lisses, garnies de nombreux points piligères. Tibias antérieurs tridentés; premier article des tarsi antérieurs aussi long que les deux suivants réunis. Tibias intermédiaires et postérieurs munis d'un double épéron et légèrement arqués en dedans. Premier article des tarsi antérieurs et postérieurs aussi long que les trois suivants réunis.

Forme et taille du *Rhyssenus Ritsemæ* dont il diffère par les angles aigus et légèrement denticulés de l'épistome, et aussi par la sculpture des élytres.

---

DESCRIPTION D'UN COLÉOPTÈRE COLYDIINE NOUVEAU DE MADAGASCAR,

PAR M. A. GROUVELLE.

---

GENUS *Sosylopsis* n. g.

*Antennae insertae super frontis marginem lateralem; basi haud occulta.*

*Ultimum articulum palporum haud aciculatum.*

*Clava antennarum biarticulata; articulis haud deussatis.*

*Coxae anticae valde admotae; cavitate aperta.*

*Coxae posticae late sejunctae; processu primi segmenti abdominis truncatum.*

Ce genre appartient à la tribu des *Bothriderini*; il tend à établir une liaison entre les Insectes de ce groupe et les *Sosylus*.

**Sosyloopsis Geayi** nov. sp.

*Elongata, subparallela, convexa, nitidula, tenuissime flavo-pubescentis; dilute castanea. Antennae subbreves; 1° articulo intus dilatato; 2° ad angulum externum primi inserto, subelongato; 3° sensim longiore quam latiore; 4° et 5° subquadratis; 6°-9° transversis, paulatim incrassatis; clava biarticulata, elongata, articulis disjunctis. Caput convexum, subtriangulare, antice truncatum, subdense punctulatum. Prothorax subquadratus, transversim et in longitudinem convexus, subparce punctulatus; apice truncato; angulis anticis rotundatis; lateribus subrectis, tenuiter marginatis; angulis posticis obtusis, subrotundatis; basi arcuata, tenuiter marginata. Scutellum subsemicirculare. Elytra ad basin prothorace paulo latiora; subparallela, ad apicem conjunctim rotundata, paulo duplo longiora quam simul latiora, punctato-striata; stria suturali paulo magis impressa; intervallis striarum latis, unilineato punctatis, ad apicem subelevatis. Long., 1,2-1,5 millimètres.*

Allongé, subparallèle, environ trois fois et demie plus long que large, convexe, peu brillant, marron clair, couvert d'une pubescence flave dorée, courte, modérément dense sur la tête et le prothorax, disposée en ligne sur chaque intervalle des stries des élytres. Antennes modérément courtes; 1<sup>er</sup> article dilaté, arrondi en dedans, presque aussi long que large; 2<sup>e</sup> inséré un peu au-dessous de l'angle apical externe du 1<sup>er</sup>, plus long que large, un peu épais; 3<sup>e</sup> subégale au 2<sup>e</sup>; 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> subcarrés; 6<sup>e</sup> à 9<sup>e</sup> transversaux, progressivement un peu plus épais; 10<sup>me</sup> et 11<sup>me</sup> formant une massue lâche, plus allongée chez le mâle; dernier article plus étroit que le précédent.

Tête convexe, subtriangulaire, tronquée en avant, à peu près aussi longue que large, presque densément pointillée, modérément rétrécie entre les naissances des antennes. Prothorax subcarré arrondi aux angles antérieurs, à peine obtusément anguleux aux angles postérieurs, en forme de coussin, un peu moins densément et un peu plus fortement ponctué que la tête; côtés finement rebordés; base arquée, finement rebordée. Écusson subsemicirculaire. Élytres un peu plus larges à la base que le prothorax, arrondis aux épaules, à peine élargis sur les côtés, arrondis ensemble au sommet, environ deux fois et un quart aussi longs que larges ensemble, moins convexes transversalement que le prothorax, ponctués-striés; stria suturale un peu plus accentuée que les autres; intervalles des stries larges, plans sur le disque, très faiblement relevés à l'extrémité; 1<sup>er</sup> intervalle un peu plus large, confusément ponctué; chacun des autres avec une ligne de petits points; marges latérales légèrement pliées, surtout vers l'extrémité; région scutellaire un peu enfoncée.

Madagascar: région de Tullear, dans les galeries d'un Scolytide. Collection du Muséum de Paris. 4 exemplaires recueillis par feu F. Geay.